




তামিম
ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক
ব্রয়লার মুরগির
খামার ব্যবস্থাপনা



তামিম-এর খামারী, বাণিজ্যে সুদূরপ্রসারী

তামিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
এর একটি প্রতিষ্ঠান



শেড নির্বাচন

১. পণ্য পরিবহণের জন্য ভাল রাস্তার সুবিধার পাশাপাশি উৎপাদন এবং বিপণন কার্যক্রমের কেন্দ্রে শেডের অবস্থান যথোপযুক্ত হওয়া উচিত।
২. শেড পূর্ব-পশ্চিম লম্বা হওয়া উচিত এবং প্রস্থ ২৫ ফুটের বেশী হওয়া উচিত নয়। বিশেষত তাপ বিকিরণ প্রতিরোধ করার জন্য শেডের পুরো দৈর্ঘ্যের সাথে পাশে প্যাভেলের (চালের বর্ধিতাংশ) ব্যবস্থা থাকা উচিত।
৩. পানির গুণগত মান (কঠিনতা/ওয়াটার হার্ডনেস) ৬০০ পিপিএম এর নিচে হওয়া উচিত (পানির কঠিনতা নিরূপনের জন্য নির্ধারিত স্ট্রিপ দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে) এবং পিএইচ ৬.০০ থেকে ৮.০০ এর মধ্যে হওয়া উচিত।
৪. প্রতি ১২০০ বর্গফুটের জন্য ৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ পানির ট্যাঙ্ক থাকতে হবে (প্রতিটি শেডে প্রধানত ৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পানির ট্যাঙ্ক থাকতে হবে, একটি ঔষধের জন্য এবং অন্যটি পানি পানের জন্য)।
৫. শেডের উভয় দিকের পুরো দৈর্ঘ্যের জন্য বাইরের পাশের পর্দা এবং শেডের ভিতরে ব্রুডিং এর চারপাশে (মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার জন্য) ৩৩% পর্দা দরকার। ভালো আলোর জন্য সাদা এবং হলুদ রঙের পর্দা ব্যবহার করতে হবে।
৬. ন্যূনতম ২০০ জিএসএম প্রকৃতির পলিথিন শিট অথবা ব্যবহৃত ফিডের খালী ব্যাগ দ্বারা প্রস্তুতকৃত পর্দা হলে ভালো হয়।
৭. ভাল জৈব নিরাপত্তা সম্পন্ন কংক্রিট নির্মিত জায়গায় ফুট বাথ দেয়া আবশ্যিক।



প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১. অটো ফিডার: ৪০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ভালো মানের কোম্পানির তৈরি কোন ও গ্রিলসহ ১টি অটো ফিডার ব্যবহার করুন।



২. ড্রিংকার: ৪০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি চিক ড্রিংকার এবং একই সংখ্যক বাচ্চার জন্য ১টি অটো বেল/জাম্বো ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।



৩. টায়ার ফিডার: ২০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি টায়ার ফিডার প্রয়োজন।



৪. হাইগ্রোমিটার: প্রতিটি শেডের জন্য ডিজিটাল হাইগ্রোমিটার ব্যবহার করতে হবে।



৫. ক্রডার: ১০০০টি (৫০০+৫০০) মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি গ্যাস ক্রডার অথবা ৫০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি কয়লা/বুখারী হিটার রাখতে হবে।



৬. অতিরিক্ত সরঞ্জাম: ৫০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য রেকিং সরঞ্জাম, হ্যাভ/পাওয়ার স্প্রেয়ার, ফিডার ট্রে, পার্টিশন - এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে।

শেড পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ

মুরগির সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের অবস্থা বজায় রাখার জন্য পরিবেশ ও খামারের সঠিক পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্তকরণ, বর্জ্য নিরাপদে স্থানান্তর নিশ্চিত করণ আবশ্যিক। এর ফলে দ্রুত বৃদ্ধির হার, কম মৃত্যুহার, উন্নত খাদ্য দক্ষতা, দৈনিক লাভের হার বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন খরচ কমে আসবে।

১. শেড পরিষ্কার ও প্রস্তুতি

- মুরগি বিক্রির পরপরই খাবারের পাত্র খালি করুন, পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করুন এবং পাত্রগুলো শেড থেকে সরিয়ে রাখুন।
- ছাদ, সাইডওয়াল, তারের জাল ইত্যাদি থেকে মাকড়সার জাল ও ধুলো পরিষ্কার করুন।
- সবসময় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শেড পরিষ্কার করুন।

২. লিটার ব্যবস্থাপনা

- শেড থেকে সমস্ত লিটার অপসারণ করুন।
- লিটার বিক্রি করা শ্রেয়। সংরক্ষণ করতে হলে খামারের চত্বর থেকে অন্তত ১০০০ ফুট দূরে, বাতাসের দিকের বিপরীতে রাখুন।

৩. জীবাণুমুক্তকরণ

- আগের ব্যাচে ব্যাপক মৃত্যু বা সংক্রমণ হলে ফ্রেম গান ব্যবহার করে শেড জীবাণুমুক্ত করুন।
- শেড পরিষ্কার করার পর চুনের দ্রবণ তৈরি করে মেঝেতে লাগাতে হবে।

চুনের দ্রবণ তৈরির সূত্র (প্রতি ১০০০ বর্গফুট মেঝের জন্য):

- পানি - ৫০ লিটার
- চুনের গুঁড়া - ১০ কেজি
- কেরোসিন - ১ লিটার
- ফরমালিন - ১ লিটার
- লবণ - ১ কেজি
- ব্লিচিং পাউডার - ৫০০ গ্রাম
- কস্টিক সোডা - ৫০০ গ্রাম

সব উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করে মেঝেতে লাগাতে হবে। মেঝে শুকানোর পরেই চুনের দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

৪. যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা: সমস্ত পরিষ্কার/জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি খামারের বাইরে রাখতে হবে।

৫. এরিয়াল স্প্রে: শেডের ভিতরে এবং আশেপাশে প্রতি ১০০০ বর্গফুটের জন্য ফরমালিন দিয়ে এরিয়াল স্প্রে করতে হবে। ফরমালিন স্প্রে ৫% (৫০০ মিলি ফরমালিন + ১০ লিটার পানি)।

৬. পানির লাইন পরিষ্কার: প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইন পরিষ্কার করার জন্য ৯ লিটার পানি ও ১ লিটার H_2O_2 ব্যবহার করুন।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (১ম সপ্তাহ)

ক্রডিং ব্যবস্থাপনা:

- মুরগির বাচ্চা আসার ৬ ঘন্টা আগেই ক্রডিং এরিয়া প্রি-হিট করা উচিত

প্রথম
সপ্তাহে
২০০
গ্রাম

বৃত্তাকার ক্রডিং করার জন্য মেঝেতে প্রয়োজনীয় স্থান নিম্নরূপ:


বয়স (দিন)	ক্রডারে ফাঁকা জায়গা (প্রতিটি বাচ্চার জন্য প্রতি বর্গফুট)
১ থেকে ৭	০.৩০

বয়স (দিন)	তাপমাত্রা	আদ্রতা
১ - ৩	৩০ - ৩১° সেঃ	৬৫ - ৭৫%
৪ - ৫	২৮ - ৩০° সেঃ	৬৫ - ৭৫%
৬ - ১০	২৭ - ২৮° সেঃ	৬৫ - ৭৫%


৭ম দিনে ক্রডিং শীটগুলি অপসারণ করতে হবে




ক্রডিং এর ব্যাস: ৪০০ পিস বাচ্চার জন্য ১২.৪ ফুট
৫০০ পিস বাচ্চার জন্য ১৩.৮ ফুট



আরামপ্রদ তাপমাত্রা



অধিক তাপমাত্রা



অল্প তাপমাত্রা

চিত্র: ক্রুডিং ঘরে তাপমাত্রা ভেদে বাচ্চার অবস্থান

অবস্থা	বাচ্চার আচরণ	সংশোধনী পরিমাপ
অতিরিক্ত তাপ	ক্রুডিং এলাকার প্রান্তে বাচ্চারা	তাপমাত্রার স্তর হ্রাস করুন, প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখুন
অল্প তাপ	চিকস হার্ডলিং	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখুন

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য একটি পানির পাত্র বসানো উচিত, বাচ্চাকে পরিষ্কার স্যানিটাইজড পানি দিনে কমপক্ষে ৩ বার সরবরাহ করা উচিত, শীতকালে উষ্ণ পানি সরবরাহ করা উচিত।
- ১ম দিন থেকে ৩য় দিন পর্যন্ত পানির পাত্রগুলো মেঝেতে রেখে পানি সরবরাহ করতে হবে। ৪র্থ দিনে থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত ৫০% পানির পাত্র মেঝেতে এবং ৫০% পানির পাত্র তুলনামূলক উঁচুতে রাখতে হবে। ৬ষ্ঠ দিন থেকে ১০০% পানির পাত্র উঁচুতে রাখতে হবে, যাতে বাচ্চাগুলো স্বাভাবিক ভাবে পানি পান করতে পারে।
- পানির pH ৫.৫ থেকে ৬ এবং ক্লোরিনের স্তর ৩ PPM-এ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সমস্ত পানিতে অ্যাসিডিফায়ার এবং স্যানিটাইজারের প্রস্তাবিত ডোজ বজায় রাখতে হবে। ভ্যাকসিনেশনের দিন ব্যতিত অন্য দিনগুলোতে স্যানিটাইজার ছাড়া পানি ব্যবহার করা যাবে না।



খাবার ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চা আসার সাথে সাথে কাগজের ওপর খাবার ছিটিয়ে খাওয়ানো শুরু করুন এবং ২৪ ঘন্টা এই পদ্ধতি চালিয়ে যান।
- প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য ১ টি চিক ফিডার, ১ম দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।
- উপরন্ত, ২০০টি বাচ্চার জন্য ১টি টায়ার ফিডার অথবা প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য ১ টি চিক প্লেট ক্রুডিং ঘরে রাখতে হবে।
- উপরের ফিডারগুলিতে, দিনে ৫/৬ বার ফিড দিতে হবে যাতে বাচ্চাগুলি সারা দিন টাটকা খাবার পায়।
- ৫০% টায়ার ফিডার ৫ দিন পর এবং অন্য ৫০% টায়ার ফিডার ৭ দিন পর প্রত্যাহার করা যাবে।

ক্রপ স্কোরিং:

- বাচ্চা খাবার ও পানি কি পরিমাণ খেয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য ক্রপ স্কোরিং করা হয়। ক্রডিং করার ৮ ঘন্টার মধ্যে ৮৫% এবং ১৬ ঘন্টার মধ্যে ১০০% খাবার খাওয়া ও পানি পান সু-নিশ্চিত করতে হবে।



বাচ্চার পরিমাণ	ক্রপে পূর্ণ খাবার আছে	ক্রপ ফিল (%)	ক্রপ স্কোর
১০০ পিস	১০০ পিসে	১০০%	৫
১০০ পিস	৭৫ পিসে	৭৫%	৪
১০০ পিস	৫০ পিসে	৫০%	৩
১০০ পিস	২৫ পিসে	২৫%	২
১০০ পিস	১০ পিসে	১০%	১

লিটার, পর্দা এবং ওজন ব্যবস্থাপনা:

- পুরাতন লিটার নতুন লিটারের সাথে মিশ্রিত করে লিটারের আয়তন সম্প্রসারণ করতে হবে।
- বাতাসের গতি প্রকৃতি এবং তাপমাত্রার উপরে পার্শ্বের পর্দার খোলা বা বন্ধ হওয়া নির্ভর করে। পর্দা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বাতাস সরাসরি ক্রডার ঘরে অবস্থানরত বাচ্চার উপরে প্রবাহিত হতে না পারে।
- প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার ওজন ২০০ গ্রাম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবং সর্বোপরি ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক। প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার ওজন অতিরিক্ত ১০ গ্রাম বাড়ালে এটি ৩৫ দিন বয়সে বাড়তি ১০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পাবে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (২য় সপ্তাহ)

৮ম দিনে বৃত্তাকার ক্রডিং অপসারণ করুন। প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য পার্টিশন তৈরী করুন

বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের জায়গা প্রয়োজন (বর্গফুট)
৮-১৪	০.৪০ বর্গ ফুট

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- সমস্ত ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার টাটকা খাবার সরবরাহ করুন এবং ফিডার গ্রিল সহ ফিডার মাটিতে রাখুন।
- ফিড প্রবর্তনের সময় বাচ্চাগুলো খাবারের পরিমাণ যেনো কমিয়ে না দেয় সে জন্য ২ থেকে ৩ দিন আগে নতুন ফিড প্রবর্তনের সময় পুরানো ফিডের সাথে মিশ্রিত করা উচিত।

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১টি ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) ব্যবহার করে ১২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে একবার পাইপ লাইন পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন।
- পাইপলাইন পরিষ্কারের ডোজ: প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইনের জন্য ৯ লিটার পানি + ১ লিটার H_2O_2

লিটার ব্যবস্থাপনা:

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী উল্টে রেখে এমনভাবে করতে হবে যাতে বৃষ্টির মতো বাচ্চার গায়ে জীবাণুনাশক পড়ে।

দুর্বল বাচ্চা আলাদা:

- সমস্ত দুর্বল বাচ্চাকে ৮ম দিনে আলাদা করতে হবে এবং ১৪তম দিন পর্যন্ত সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।
- যে কোন বাচ্চা সুস্থ না হলে ১৪তম দিনের মধ্যে কার্ল করে ফেলতে হবে।



বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের স্থান প্রয়োজন (বর্গফুট)
১৫-১৮	০.৬০ বর্গ ফুট
১৯-২১	০.৮০ বর্গ ফুট

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- ১৫তম দিনে, ৫০% ফিডার মাটিতে এবং ৫০% ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন, ১৬তম দিনে ৭৫% ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন এবং ২৫% ফিডার মাটিতে রাখুন এবং ১৭ তম দিনের পর থেকে ১০০% ফিডার ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।
- ফিড প্রবর্তনের সময় বাচ্চাগুলো খাবারের পরিমাণ যেনো কমিয়ে না দেয় সে জন্য ২ থেকে ৩ দিন আগে নতুন ফিড প্রবর্তনের সময় পুরানো ফিডের সাথে মিশ্রিত করা উচিত।

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।

লাইট ব্যবস্থাপনা:

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়াবে।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

গ্রেডিং ব্যবস্থাপনা:

- ২০দিন বয়স থেকে মুরগির গ্রেডিং শুরু করতে হবে। মেঝেতে বাঁশের বা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে বড় ও ছোট মুরগি আলাদা করে গ্রেডিং কার্যক্রম শুরু হবে। উদাহরণ: একটি ১০০০ মুরগির শেডে মাঝ বরাবর বেড়া দিয়ে তুলনামূলক ৫০০ পিস বড় + ৫০০ পিস ছোট এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। মুরগি বিক্রয়ের দিন পর্যন্ত নিয়মিত বড় মুরগির ভাগে বড় মুরগি রাখতে হবে এবং ছোট মুরগির ভাগে ছোট মুরগি রাখতে হবে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (৪র্থ সপ্তাহ)

প্রতি ৫০০ টি বাচ্চার জন্য পার্টিশন সহ নীচের টেবিল অনুসারে মেঝেতে স্থান প্রদান করুন

বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের স্থান প্রয়োজন (বর্গফুট)
২২ দিন থেকে	সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা প্রয়োজন

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- সমস্ত ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার সুষ্ম খাবার সরবরাহ করুন এবং ফিডার গ্রিল সহ ফিডার মাটিতে রাখুন।
- ২২ তম দিন থেকে সমস্ত ফিডার প্রতিদিন ৩০ মিনিট খালি রাখুন। ফিডারগুলিতে পরবর্তী খাবার দেয়ার আগে যাতে ফিডারে থাকা ফিডের পাউডার/গুঁড়া বাচ্চারা খেয়ে ফেলে।
- ফিড প্রবর্তনের সময় বাচ্চাগুলো খাবারের পরিমাণ যেনো কমিয়ে না দেয় সে জন্য ২ থেকে ৩ দিন আগে নতুন ফিড প্রবর্তনের সময় পুরানো ফিডের সাথে মিশ্রিত করা উচিত।

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) ব্যবহার করে ২৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে একবার পাইপ লাইন পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন।
- পাইপলাইন পরিষ্কারের ডোজ: প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইনের জন্য ৯ লিটার পানি + ১ লিটার H_2O_2

লিটার ব্যবস্থাপনা:

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

লাইট ব্যবস্থাপনা:

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়বে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (৫ম ও ৬ষ্ঠ সপ্তাহ)



পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৩৫টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- প্রতিদিন দুবার পরিষ্কার করুন - সকালে এবং সন্ধ্যায় ড্রিংকারগুলিকে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে এবং সাধারণ জলে ঘষে পরিষ্কার করুন।
- ম্যানেজমেন্ট দ্বারা প্রস্তাবিত ওয়াটার স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং পানির ক্লোরিন পরিষ্কার জন্য শেষের ড্রিংকার থেকে পানি নিতে হবে। ক্লোরিন পিপিএম ন্যূনতম ৩ নিশ্চিত করুন।

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- ছত্রাকের সংক্রমণ এড়াতে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সব ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার টাটকা ফিড সরবরাহ করুন এবং সব ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন।
- সমস্ত ফিডার প্রতিদিন ৩০ মিনিট খালি রাখুন। ফিডারগুলিতে পরবর্তী খাবার দেয়ার আগে যাতে ফিডারে থাকা ফিডের পাউডার/গুঁড়া বাচ্চারে খেয়ে ফেলে।
- গ্রীষ্ম/গরম অবস্থায়, তাপ চাপ এবং হিট স্ট্রোক সম্পর্কিত মৃত্যু এড়াতে ফিড নিয়ন্ত্রণের জন্য বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মুরগিগুলোকে খাবার প্রদান বন্ধ রাখুন বা ফিডারগুলো উত্তোলন করুন।

লিটার ব্যবস্থাপনা:

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

লাইট ব্যবস্থাপনা:

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়বে।



তামিম
ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

খামার শিল্পে আস্থা ও খামারিদের কাজক্ষিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তামিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ গড়ে তুলেছে চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামার প্রকল্প “তামিম ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস”। তামিম এগ্রো বাংলাদেশে শীর্ষ ১০টি কোম্পানির মধ্যে অন্যতম পোল্ট্রি ফার্মিং এবং ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৫০০০টির বেশি খামারের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক পোল্ট্রি খামারের কার্যক্রম যুক্ত রয়েছে। চুক্তিভিত্তিক খামার থেকে উৎপাদিত মুরগিগুলো যেমন সোনালী, সোনালী হাইব্রিড, কালার বার্ড ও ব্রয়লার দেশের বৃহত্তম শিল্পনগর ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাজারে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৫০০০ জন ব্রয়লার ব্যবসায়ী/খামারি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চুক্তিবদ্ধ ব্রয়লার ফার্মিংয়ের আওতাভুক্ত। এই প্রকল্পটি খামারি এবং ইন্টিগ্রেটর উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করে। কন্ট্রোল্ডচ্যুয়াল ফার্মস প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটর/কোম্পানি একটি স্বাধীন খামারির বিপরীতে বুকি নেয়। ইন্টিগ্রেটর খামারিদের একদিন বয়সী ছানা (DOC), সুখম খাদ্য, ওষুধ এবং তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়। বিক্রয় ও সেবার পাশাপাশি প্রতিটি ফ্লকের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক দ্বারা সার্বক্ষণিক পরামর্শ এবং দৈনিক ভিজিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে।

তামিম এগ্রো চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামারের সমন্বিত চুক্তির মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ৫০০০টির বেশি স্বনির্ভর খামারি এবং ৫০০০ গ্রামীণ পরিবার বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে পড়া উত্তর জনপদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তামিম এগ্রো এর চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামার একটি অন্যতম প্রকল্প হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। “বিজ্ঞানসন্মত যুগোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার তামিম কন্ট্রোল্ড ফার্মস প্রকল্পের অঙ্গীকার” এই মূলমন্ত্র নিয়ে তামিম কন্ট্রোল্ড ফার্মস অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে।

ব্রাঞ্চ অফিস

- বগুড়া: ০১৩২১-২৩৩৭৭৬
- রাজশাহী: ০১৩২১-২৩৩৭৯০
- যশোর: ০১৩১৮-২২১১৫০
- কিশোরগঞ্জ: ০১৩২৯-৬৩১৩৯৬
- কুমিল্লা: ০১৩২১-২৩৩৭৪৩
- ময়মনসিংহ: ০১৩২৯-৬৩১৩৬৯
- লালমনিরহাট: ০১৩২১-২৩৩৮০৬

- রংপুর: ০১৩২১-২৩৩৭৪০
- নাটোর: ০১৩১৮-২২১১৫৬
- টাংগাইল: ০১৩২১-২৩৩৭২৩
- নরসিংদী: ০১৩২৯-৬৩১৩৯৬
- চাপাই: ০১৩২১-২৩৩৭৬২
- গাজীপুর: ০১৩৩৪-৯৩৪৪৮৮

তামিম ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

সুজাবাদ, শাজাহানপুর, বগুড়া ৫৮০০, বাংলাদেশ

গ্রাহক সেবা - ০১৮১১-৬৫৬৬৯৯